

ANNEXE 2 : Liste d'espèces mellifères**Liste des espèces indigènes éligibles pour la plantation de haies**

Les espèces mellifères sont reprises en gras et astérisque

NOM	Préférences ou exigences
Aubépine à un style (<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.) *	
Aubépine à deux styles (<i>Crataegus laevigata</i> (Poiret) DC.) *	
Aulne glutineux (<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn.) *	hy
Bouleau pubescent (<i>Betula pubescens</i> Ehrh.)	(ac) (hy)
Bouleau verruqueux (<i>Betula pendula</i> Roth)	
Bourdaine (<i>Frangula alnus</i> Mill.)*	
Cerisier à grappes (<i>Prunus padus</i> L.)	(ac)
Charme (<i>Carpinus betulus</i> L.) *	
Châtaignier (<i>Castanea sativa</i> Mill.)*	ac
Chêne pédonculé (<i>Quercus robur</i> L.) *	
Chêne sessile (<i>Quercus petraea</i> Lieblein) *	
Cognassier (<i>Cydonia oblonga</i> Mill.) *	
Cornouiller mâle (<i>Cornus mas</i> L.)*	ca
Cornouiller sanguin (<i>Cornus sanguinea</i> L.)*	(ca)
Eglantier (<i>Rosa canina</i> L.)*	
Erable champêtre (<i>Acer campestre</i> L.)*	(ca)
Erable plane (<i>Acer platanoides</i> L.) *	
Erable sycomore (<i>Acer pseudoplatanus</i> L.) *	
Framboisier (<i>Rubus idaeus</i> L.) *	ac
Frêne commun (<i>Fraxinus excelsior</i> L.)	
Fusain d'Europe (<i>Evonymus europaeus</i> L.)	(ca)
Genêt à balais (<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link)*	ac
Griottier (<i>Prunus cerasus</i> L.)*	
Groseillier à maquereaux (<i>Ribes uva-crispa</i> L.)*	(ca)
Groseillier noir ou cassis (<i>Ribes nigrum</i> L.)*	hy
Groseillier rouge (<i>Ribes rubrum</i> L.)*	(ca) (hy)
Hêtre commun (<i>Fagus sylvatica</i> L.)	
Houx (<i>Ilex aquifolium</i> L.) *	(ac)
Lierre commun (<i>Hedera helix</i>) *	
Merisier (<i>Prunus avium</i> L.) *	
Myrobalan (<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.) *	
Néflier (<i>Mespilus germanica</i> L.) *	ac
Nerprun purgatif (<i>Rhammus cathartica</i> L.)	(ca) (x)
Noisetier (<i>Corylus avellana</i> L.) *	
Noyer commun (<i>Juglans regia</i> L.)	(ca)
Orme champêtre (<i>Ulmus minor</i> Mill.)	
Orme de montagne (<i>Ulmus glabra</i> Huds.)	
Peuplier blanc (<i>Populus alba</i> L.)	(hy)
Peuplier grisard (<i>Populus canescens</i> (Ait.) Smith)	(hy)
Peuplier tremble (<i>Populus tremula</i> L.)	
Poirier cultivé (<i>Pyrus communis</i> L. subsp. <i>communis</i>) *	
Pommier commun (<i>Malus sylvestris</i> (L.) Mill. subsp. <i>mitis</i> (Wallr.) Mansf.) *	
Pommier sauvage (<i>Malus sylvestris</i> (L.) Mill. subsp. <i>sylvestris</i>) *	

CHARTE D'ENGAGEMENT « PROVINCE MAYA »

NOM	Préférences ou exigences
Prunellier (<i>Prunus spinosa L.</i>) *	(x)
Prunier crèque (<i>Prunus domestica L. subsp. insititia (L.) Bonnier et Layens</i>)*	(ca)
Ronce bleue (<i>Rubus caesius L.</i>) *	(ca)
Saule à oreillettes (<i>Salix aurita L.</i>) *	hy
Saule à trois étamines (<i>Salix triandra L.</i>) *	(hy)
Saule blanc (<i>Salix alba L.</i>) *	(hy)
Saule cendré (<i>Salix cinerea L.</i>) *	hy
Saule des vanniers (<i>Salix viminalis L.</i>) *	(hy)
Saule fragile (<i>Salix fragilis L.</i>) et son hybride avec <i>S. alba</i> (<i>S. x rubens Schrank</i>)	(hy)
Saule marsault (<i>Salix caprea L.</i>)*	
Saule pourpre (<i>Salix purpurea L. var. lambertiana (Smith) Koch</i>) *	(hy)
Sorbier des oiseleurs (<i>Sorbus aucuparia L.</i>)*	(ac)
Sureau à grappes (<i>Sambucus racemosa L.</i>) *	ac
Sureau noir (<i>Sambucus nigra L.</i>) *	(ca)
Tilleul à grandes feuilles (<i>Tilia platyphyllos Scop.</i>)*	(ca)
Tilleul à petites feuilles (<i>Tilia cordata Mill.</i>)*	(x)
Troène commun (<i>Ligustrum vulgare L.</i>)*	ca x
Viorne lantane (<i>Viburnum lantana L.</i>) *	ca x
Viorne obier (<i>Viburnum opulus L.</i>) *	

LEGENDE DES PREFERENCES OU EXIGENCES PAR RAPPORT AUX SOLS

ca : à résérer aux sols calcarifères

ac: à résérer aux sols acides

hy : à résérer aux sols frais à humides

x : convient pour tous les sols secs

Lorsque le sigle est entre parenthèses, il s'agit plutôt d'une préférence que d'une exigence

Remarques :

1. On évitera les provenances "exotiques" pour ces ligneux, de même que les cultivars.
A ce titre, quelques espèces, bien qu'indigènes, n'ont pu être reprises ci-dessus car il n'est pas possible de s'approvisionner dans le circuit commercial actuellement.
2. Dans le cas du poirier, des pommiers, des pruniers et des groseilliers, les variétés locales ou rustiques seront privilégiées.
L'if (*Taxus baccata*) et le buis (*Buxus sempervirens*), qui sont deux espèces indigènes (mais à répartition limitée en Wallonie) convenant bien en principe pour la confection de haies, ont été écartées en raison de leur toxicité pour le bétail et pour l'homme.

Parterres, jardinières et prés fleuris mellifères

Nom	Usage recommandé	Remarques
Achillée (<i>Achillea sp L.</i>)	Mixed-border	
Agripaume cardiaque (<i>Leonurus cardiaca L.</i>)		
Ancolie (<i>Aquilegia sp L.</i>)	Mixed-border	
Angélique (<i>Angelica archangelica L.</i>)	Mixed-border	
Artichaut (<i>Cynara scolymus L.</i>)	Mixed-border	
Asperge (<i>Asparagus officinale L.</i>)	Mixed-border	
Basilic (<i>Ocimum basilicum L.</i>)	Aromatique	
Bette (<i>Beta vulgaris L.</i>)	Mixed-border	
Bleuet des champs (<i>Centaurea cyanus et sp L.</i>)	Pré fleuri	
Bouillon blanc (<i>Verbascum sp L.</i>)		
Boule d'azur (<i>Echinops sp L.</i>)		
Bourrache (<i>Borago officinalis L.</i>)	Pré fleuri	
Cardère (<i>Dispsacus fullonum L.</i>)		Favorable aux oiseaux
Caryopteris clandonensis (<i>Caryopteris clandonensis Bunge</i>)	Parterre arbustif	gélif
Céanode (<i>Ceanothus floribunda</i>)		gélif
Chèvrefeuille (<i>Lonicera caprifolium et fragrantissima L.</i>)	Liane, grimpant	
Choux (<i>Brassica sp L.</i>)	Mixed-border	A laisser fleurir
Clematis sp (<i>Clematis sp L.</i>)	Grimpant	
Cléome (<i>Cleome spinosa L.</i>)	Parterres	
Consoude, oreille d'âne (<i>Sympphytum officinale L.</i>)	Couvre-sol, engrais vert	
Coquelicot, pavot (<i>Papaver sp L.</i>)		
Coriandre (<i>Coriandrum sativum L.</i>)	Pré fleuri	
Cosmos sulphureus (<i>Cosmos sulphureus Cav.</i>)	Pré fleuri	
Coucou-primevère (<i>Primula sp. L.</i>)	Jardinières	
Doronicum sp (<i>Doronicum sp L.</i>)	Jardinières	
Epilobe (<i>Epilobium hirsutum L.</i>)		
Erigeron sp (<i>Erigeron sp L.</i>)		
Fausse bruyère Callune (<i>Calluna vulgaris L.</i>)	Jardinières	
Fenouil (<i>Foeniculum vulgare Mill.</i>)	Mixed-border	
Fraisier (<i>Fragaria vesca L.</i>)		
Giroflée (<i>Cheiranthus cheiri L.</i>)	Parterres- jardinières	
Grande aunée (<i>Inula helenium L.</i>)	Mixed-border	
Gueule de loup (<i>Anthirrinum majus L.</i>)	Jardinières-parterres	
Haricot (<i>Phaseolus vulgaris L.</i>)		
Hellebore (<i>Helleborus sp L.</i>)	Jardinières	
Hémérocalle (<i>Hemerocallis sp L.</i>)	Mixed-border	
Houblon (<i>Humulus lupulus L.</i>)	Jardinières	
Hysope (<i>Hysopus officinalis L.</i>)	Mixed-border	
Lamier blanc (<i>Lamium album L.</i>)	Spontané	
Lavande (<i>Lavandula sp Mill.</i>)	Jardinières- parterres	
Lavatera annuelle et vivace (<i>Lavatera trimestris et rosea L.</i>)		
Lin (<i>Linum usitatissimum L.</i>)		
Luzerne (<i>Medicago sativa L.</i>)	Pré fleuri	
Lis (<i>Lilium sp L.</i>)		
Maïs (<i>Zea mays L.</i>)		

CHARTE D'ENGAGEMENT « PROVINCE MAYA »

Mauve des bois (<i>Malva sylvestris</i> L.)		
Mélilot (<i>Melilotus officinalis</i> Lam.)	Pré fleuri	
Mélilot blanc (<i>Melilotus albus</i> Med.)	Pré fleuri	
Mélisse (<i>Melissa sp</i> L.)	Jardinières	
Menthe (<i>Mentha sp</i> L.)		
Millepertuis (<i>Hypericum sp</i> L.)	Mixed-border	
Monnaie du pape (<i>Lunaria annua</i> L.)		
Moutarde (<i>Sinapis sp</i> L.)		
Mûrier Fruits Noirs (<i>Morus nigra</i> L.)	Arbre de position	
Muscari (<i>Muscari sp</i> L.)	Jardinières	
Myosotis (<i>Myosotis sp</i> L.)	Jardinières	
Myrtille (<i>Vaccinium myrtillus</i> L.)	Petits fruits	
Nepeta sp (<i>Nepeta sp</i> L.)	Aromatique	
Oreille de lapin (<i>Stachys sp</i> L.)	Couvre-sol	
Origan (<i>Origanum vulgare</i> L.)	Aromatique	
Pastel des teinturiers (<i>Isatis tinctoria</i> L.)	Mixed-border	
Pervenche (<i>Vinca minor</i> L.)	Couvre-sol	
Phacélie à feuilles de tanaise (<i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth.)	Pré fleuri - engrais vert	
Pied d'alouette (<i>Delphinium sp</i> L.)	Mixed-border	
Pissenlit (<i>Taraxacum officinale</i> Weber.)	Spontané	
Potiron-coloquinte... (<i>Cucurbita sp</i> L.)		
Pulmonaire (<i>Pulmonaria officinalis</i> L.)	Couvre-sol	
Radis (<i>Raphanus sativus</i> L.)		
Romarin (<i>Rosmarinus officinalis</i> L.)	Aromatique	
Rose trémière (<i>Alcea rosea</i> L.)	Mixed-border	
Salicaire (<i>Lythrum</i> L.)		
Sauge (<i>Salvia sp</i> L.)	Aromatique jardinières	
Scabieuse (<i>Scabiosa sp</i> L.)		
Soucis (<i>Calendula officinalis</i> L.)	Mixed-border	
Thym serpolet (<i>Thymus sp</i> L.)	Aromatique	
Tournesol (<i>Helianthus annuus</i> L.)	Parterres -pré fleuri	
Trèfle blanc (<i>Trifolium repens</i> L.)	Pré fleuri	
Trèfle des prés (<i>Trifolium pratense</i> L.)	Pré fleuri	
Tussilage (<i>Tussilago farfara</i> L.)	Zone	
Véronique (<i>Veronica sp</i> L.)		
Verveine (<i>Verbena sp</i> L.)	Aromatique	
Viperine (<i>Echium vulgare</i> L.)	Pré fleuri	

Arbres mellifères

Nom	Usage recommandé	Remarques
Arbres mellifères indigènes		
Aulne (<i>Alnus glutinosa</i> L.)	Bord de cours d'eau	
Bouleau pubescent (<i>Betula pubescens</i> Ehrh.)	Arbre de position ou d'alignement	
Buis (<i>Buxus sempervirens</i> L.)	Groupé	Mellifère en port libre seulement
Châtaignier (<i>Castanea sativa</i> Mill.)	Arbre de position ou d'alignement ou massif	
Chêne rouvre (<i>Quercus robur</i> L.)	Arbre de position ou d'alignement, massif	

CHARTE D'ENGAGEMENT « PROVINCE MAYA »

Epicea commun (<i>Picea abies</i> L.)	Arbre de position	
Erable champêtre (<i>Acer campestre</i> L.)	Arbre de position ou d'alignement ou groupé ou massif	
Erable plane (<i>Acer platanoides</i> L.)	Arbre de position ou d'alignement ou massif	
Erable sycomore (<i>Acer pseudoplatanus</i> L.)		
Frêne élevé (<i>Fraxinus excelsior</i> L.)	Arbre de position ou d'alignement ou massif	
Hêtre (<i>Fagus sylvatica</i> L.)	Arbre de position ou d'alignement ou massif	
Houx (<i>Ilex sp.</i> L.)	Groupé, isolé	Floraison souvent limitée, en port libre
If (<i>Taxus baccata</i> L.)	Groupé	En port libre (toxique)
Merisier (<i>Prunus avium</i> L.)	Forestier	
Noisetier (<i>Corylus avellana</i> L.)	Lisière massif	
Noyer (<i>Juglans regia</i> L.)	Arbre de position	
Orme champêtre (<i>Ulmus campestris</i> L.)	Arbre de position ou d'alignement	Sensible aux maladies
Peuplier noir (<i>Populus nigra</i> L.)	Arbre de position	
Pin sylvestre (<i>Pinus sylvestris</i> L.)	Arbre de position	
Saule blanc (<i>Salix alba</i> L.)	Arbre de position, alignement, massif	
Saule marsault (<i>Salix caprea</i> L.)	Arbre de position, zone humide	
Sorbier (<i>Sorbus sp</i> L.)	Arbre de 3e grandeur	
Tilleul à grandes feuilles (<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.)	Arbre de position ou d'alignement	
Tilleul à petites feuilles (<i>Tilia cordata</i> Mill.)	Arbre de position ou d'alignement	

Arbres fruitiers

Cognassier (<i>Cydonia oblonga</i> Mill.)	Fruitier	
Griottier (<i>Prunus cerasus</i> L.)	Fruitier	
Néflier (<i>Mespilus germanica</i> L.)	Fruitier	
Poirier (<i>Pyrus sp</i> L.)	Fruitier	
Pommier (<i>Malus sp</i> Mill.)	Fruitier	
Prunier domestique (<i>Prunus domestica</i> L.)	Fruitier	
Prunier mirobolant (<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.)	Fruitier	
Vigne (<i>Vitis vinifera</i> L.)	Petits fruits	

Arbres mellifères non indigènes, à valeur décorative

Catalpa (<i>Catalpa platanoides</i> Walter)	Arbre de position	
Cytise pluie d'or (<i>Cytisus vulgarae</i> L.)	Arbre de position	Mellifère odorant
Glycine (<i>Wisteria sinensis</i> Sims)	Grimpant	Très mellifère
Lilas (<i>Syringa vulgaris</i> L.)	Groupé, isolé	Très mellifère
Sapin Blanc (<i>Abies alba</i> Mill.)	Arbre de position	
Seringat (<i>Philadelphus sp</i> L.)	Groupé, buisson	Très mellifère
Staphylea pinata (<i>Staphylea pinata</i> L.)		